Ficha Técnica Terapia V.A.C. ®

Apósito Abdominal para abdomen abierto ABThera™

Fabricante / Distribuidor Autorizado:
KCI / Medcorp S.A.



Método de Esterilización: Rayos Gamma

Certificación
- FDA
- ISO 9001/2008
- ISO 13485/2003
- CE: producto sanitario clase IIA
- ISP Medcorp S.A.

Presentación
Unidad estéril o Caja x 5 unidades

Modo de Acción:

- Elimina el fluido peritoneal de lo profundo de los surcos para cólicos y ayuda a reducir edemas.

Descripción Técnica:

El Sistema de Terapia de Presión Negativa para abdomen abierto ABTHERA™ es un sistema de cierre para abdomen temporal que ayuda a controlar de manera oportuna el tratamiento del abdomen abierto y obtener un cierre fascial primario.

Composición Kit:

1. Lámina protectora visceral antiadherente 66,5 x 80,2 cm que evita el contacto directo de las esponjas con las vísceras. La lámina está fabricada con dos (2) capas de poliuretano. Cuenta con esponja de poliuretano encapsulada de un espesor de 10mm; con extensiones radiales, segmentadas las cuales pueden ser ajustables a la cavidad abdominal. Posibilidad de recortarla.
2. Dos esponjas prepicadas, estériles, hidrofóbicas, de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, de 38 x 25 cm, permite el flujo continuo de los fluidos en la cavidad abdominal, pre - cortada para ajustarla al tamaño de la cavidad a tratar. Posibilidad de recortarla.
3. Incluye cuatro láminas V.A.C. ® Drape o film de plástico adhesivo 30,5 x 26 cm, que permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión negativa. Apósitos Transparentes. Libre Látex, hipo alergénico.
4. Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™. Manguera anticolapsable.
5. El tubo posee un dispositivo o pinza que impide el paso de los fluidos o de la presión negativa, lo cual facilita la desconexión del paciente cuando el personal de salud lo indique.

Indicaciones:

- ✓ **Síndrome Compartimental Abdominal**
- ✓ **Pancreatitis necrotizante aguda**
- ✓ **Sepsis abdominal**
- ✓ **Laparotomía exploratoria**

Precauciones:

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos:

- Proporciona tensión medial, lo cual minimiza la retracción de la fascia y la perdida de dominio.
- Eliminación de material infeccioso y mediadores de la inflamación en el fluido peritoneal.
- Ayuda a aislar las vísceras y proteger el contenido abdominal del ambiente externo.
- Proporciona separación entre la pared abdominal y las vísceras, por lo cual protege el contenido visceral.
- Permite un acceso rápido para reingreso al abdomen sin la necesidad de suturas para su colocación.
- Proporciona un ambiente húmedo.

- Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.
- Pacientes con problemas de hemostasia.
- Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.
- Mal nutrición no tratada.
- Pacientes con mala disposición o agresivos.
- Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.

Contraindicaciones:

- Fístulas
- Hemorragia
- Abdomen congelado

ABTHERA™ SENSATRAC™ VAC. Apósito para abdomen abierto: 1 capa de protección visceral ovalada (66,5 x 80, 2 cm) con esponja azul cuadriculada de 1cm de grosor. 2 esponjas prepicadas GRANUFOAM azul (38 x 25 cm), 4 láminas de adhesivo o film VAC® (30,5 x 26 cm), 1 tubería SENSATRAC™ con conector, 1 regla desechable con adhesivo rotulado.

Opciones de Orden	Código de Producto
Unidad – Caja de 5	M8275026/5