Apósitos Granufoam V.A.C.® XL

Fabricante / Distribuidor Autorizado:

KCI / Medcorp S.A.

Método de Esterilización: Rayos Gamma

Certificación
- FDA
- ISO 9001/2008
- ISO 13485/2003
- CE: producto sanitario clase IIb
- ISP Medcorp S.A.

Presentación
Unidad estéril o Caja x 5 o 10 unidades

Modo de Acción:

Cuando el apósito Granufoam V.A.C.® ya instalado se colapsa y comprime, gracias a la presión negativa configurada en el equipo, entrar en contacto con el lecho de la herida generando ***micro tensión***; aumento de vascularización, aumento división celular, extracción del edema circundante, eliminación de mediadores de inflamación, material infeccioso y aumento de tejido de granulación y ***macro tensión***; disminución del volumen y diámetro de la herida afrontando bordes y favoreciendo mecanismos para la cicatrización.

Descripción Técnica:

Kit de esponja de equipo para tratamiento de herida por cierre asistido al vacío V.A.C. a presión negativa.

Composición:

1. Una esponja de poliuretano 60 x 30 x 1,5 cm, de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X), que se adapta a los contornos de las heridas profundas e irregulares, y fomente la actividad celular y la formación de tejidos de granulación en las heridas. Posibilidad de recortarla.

2. Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ (Sistema bioseguro con software). Manguera anticolapsable.

3. Cinco láminas V.A.C. ® Drape o film de plástico adhesivo, que permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión negativa. Apósito transparente. 30,5 x 26 cm c/u.

4. Estéril. Libre de látex, hipoalergénico y componentes tóxicos.

5. De un solo uso.

Indicaciones:

Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, entre otras.

Precauciones:

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos:

- Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.
- Pacientes con problemas de hemostasia.
- Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.

- Mal nutrición no tratada.
- Pacientes con mala disposición o agresivos.
- Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.
- En pacientes con órganos o vísceras expuestas, utilizar en combinación con apósito Whitefoam V.A.C. ®.

Contraindicaciones:

- Fístulas no entéricas sin explorar.
- Osteomielitis no tratada.
- Heridas malignas (excepto para mejor la calidad de vida).
- Tejido necrótico con presencia de escaras.
- Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga intestinal.

VAC. **GRANUFOAM™ extra largo Kit** 1 apósito de esponja GRANUFOAM™ (60 x 30 x 1.5cm), 5 laminas de film V.A.C.® (30.5 x 26cm) 1 tuberia SENSAT.R.A.C.™ con conector, 1 regla desechable con adhesivo rotulado

Opciones de Orden	Código de Producto
Unidad – Caja de 10	M8275065/5